

Streszczenie pracy doktorskiej lek. Anny Lasek pt.: „*Factors influencing outcomes of laparoscopic appendectomy – results from multicenter cohort Pol-LA study (Polish Laparoscopic Appendectomy)*”

Cel

Głównym celem prac było określenie czynników wpływających na wyniki laparoskopowych appendektomii w oparciu o wyniki badania Pol-LA (Polish Laparoscopic Appendectomy).

Podsumowanie wyników i wnioski

Wyniki laparoskopowych appendektomii różnią się w zależności od wieku pacjentów, a ryzyko wystąpienia powiklanej postaci ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego rośnie wraz z wiekiem chorych. Użycie staplera do zaopatrzenia kikuta wyrostka robaczkowego wiąże się z najlepszymi wynikami laparoskopowych appendektomii u chorych z powiklaną postacią ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego. Powikłana postać ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego wiąże się z gorszymi wynikami laparoskopowych appendektomii a płeć żeńska, otyłość, wiek powyżej 50 lat, objawy trwające powyżej 48 godzin, wyższy wynik w skali Alvorado oraz CRP powyżej 100 mg/l stanowią czynniki ryzyka wystąpienia tej postaci choroby. Wystąpienie ropni wewnątrzbrzusznych w przebiegu pooperacyjnym związana jest z pogorszeniem wyników laparoskopowych appendektomii, a powikłana postać OZWR jest istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia tego powikłania.